

GRUPO BRYOMED CA, SA DE CV

bryomiXol

USO DEL BRYOMIXOL IV

El medicamento debe ser guardado en un lugar fresco y sombreado a temperatura ambiente, lejos de la luz solar y olores intensos.

Para la aplicación del producto Bryomixol, es condición indispensable hacer una buena succión para activar el medicamento.

Proceder de la siguiente manera:

- Antes de su uso, tomar el frasco por su cuello y golpearlo, vigorosamente, contra la palma de la mano contraria unas 20 veces. Se observará en el cuello del frasco una espuma que garantiza la correcta activación y potencia de sus cualidades terapéuticas.



Para la aplicación de Bryomixol IV 50ml, el frasco se conecta directamente a un descartable de suero y se toma una vena de grueso calibre, preferentemente la del pliegue del antebrazo, se puede usar un catéter No. 24, ya que el líquido es sumamente acuoso y pasa con facilidad por catéteres delgados. El líquido no es cáustico ni corrosivo, los ingredientes están disueltos en una solución hidroalcohólica de 3 al 4%. En caso de extravasación solo se producirá una irritación pasajera.

Bryomixol IV 50ml debe pasar por goteo endovenoso lento a razón de 12 a 15 gotas por minuto para que su tiempo total sea alrededor de 1 hora.

www.bryomed.com.